

Requisitos mínimos de vacunas en el estado de Texas de 2018 - 2019 para las guarderías y centros de pre-kinder

Esta gráfica resume los requisitos para vacunas incorporados al Código Administrativo de Texas (TAC), título 25, Servicios de salud, secciones 97.61 a 97.72. Esta gráfica no tiene como propósito sustituir las consultas al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles. El Código de Recursos Humanos, capítulo 42, confiere al Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) la autoridad para establecer los requisitos de inmunización.

Los niños deberán mostrar comprobantes de vacunación aceptables antes de inscribirse, asistir o ser transferidos a una guardería o una escuela primaria o secundaria pública o privada de Texas

Edad a la que el niño debe recibir las vacunas para cumplir con los requisitos:	Número mínimo de dosis requeridas de cada vacuna							
	DTaP	Polio	HepB	Hib	PCV	MMR	Varicella	HepA
De 0 a 2 meses								
Antes de los 3 meses	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis			
Antes de los 5 meses	2 dosis	2 dosis	2 dosis	2 dosis	2 dosis			
Antes de los 7 meses	3 dosis	2 dosis	2 dosis	2 dosis ¹	3 dosis ²			
Antes de los 16 meses	3 dosis	2 dosis	2 dosis	3 dosis ¹	4 dosis ²	1 dosis ³	1 dosis ³	
Antes de los 19 meses	4 dosis	3 dosis	3 dosis	3 dosis ¹	4 dosis ²	1 dosis ³	1 dosis ³	
Antes de los 25 meses	4 dosis	3 dosis	3 dosis	3 dosis ¹	4 dosis ²	1 dosis ³	1 dosis ³	1 dosis ³
Antes de los 43 meses, pero antes de la entrada a kinder	4 dosis	3 dosis	3 dosis	3 dosis ¹	4 dosis ²	1 dosis ³	1 dosis ³	2 dosis ³

¹ Una serie completa de la vacuna Hib consta de dos dosis más una dosis de refuerzo a los 12 meses de edad o después (tres dosis en total). Si un niño recibe la primera dosis de la vacuna Hib entre los 12 y los 14 meses de edad, se requiere solo una dosis adicional (dos dosis en total). Si un niño ha recibido una sola dosis de la vacuna Hib entre o después de los 15 y los 59 meses de edad, cumple con los requisitos de esta vacuna específica. Los niños de 60 meses de edad o mayores no requieren recibir la vacuna Hib.

- ² Si la serie de vacunas PCV se empieza a administrar cuando el niño tiene siete meses de edad o más, o si el niño está atrasado con alguna dosis de la serie, entonces puede que no sean necesarias las cuatro dosis. Por favor refiérase a la información siguiente para ayudarse a cumplir con los requisitos:
- Para los niños de siete a 11 meses de edad, se requieren dos dosis.
 - Para los niños de 12 a 23 meses de edad: si han recibido tres dosis antes de los 12 meses de edad, entonces requieren una dosis adicional (para un total de cuatro dosis) a los 12 meses de edad o después. Si recibieron una o dos dosis antes de los 12 meses de edad, entonces requieren un total de tres dosis, y al menos una de las dosis deberán recibirla a los 12 meses de edad o después. Si no han recibido ninguna dosis, entonces requieren dos dosis y ambas deberán recibirlas a los 12 meses de edad o después.
 - Los niños de entre 24 meses y 59 meses de edad cumplen con los requisitos si recibieron al menos tres dosis, y una de las cuales la recibieron a los 12 meses de edad o después; o dos dosis, ambas recibidas a los 12 meses de edad o después; o una dosis recibida a los 24 meses de edad o después. De lo contrario, es necesaria una dosis adicional. Los niños de 60 meses de edad o mayores no necesitan recibir la vacuna PCV.
- ³ Para la vacuna MMR y las vacunas contra la varicela y contra la hepatitis A, la primera dosis debe administrarse en o después del primer cumpleaños. Las dosis de vacunas administradas dentro de los 4 días anteriores al primer cumpleaños satisfacen los requisitos.

La información sobre las exclusiones de los requisitos de inmunización, la inscripción provisional y la documentación aceptable de las inmunizaciones puede encontrarse en las secciones 97.62, 97.66 y 97.68, respectivamente, del Código Administrativo de Texas.

Las vacunas:

DTaP: Difteria, tétanos y tosferina acelular (pertussis); en el registro pueden aparecer como DT o DTP

Polio: IPV - vacuna inactivada contra la poliomiélitis (polio); OPV - vacuna oral contra la poliomiélitis

HepB: Vacuna contra la hepatitis B

Hib: Vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo b

PCV o PCV13: Vacuna antineumocócica conjugada

MMR: Vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubeola

Varicella: Vacuna contra la varicela. En el registro puede aparecer escrita como VAR.

HepA: Vacuna contra la hepatitis A



TEXAS
Health and Human
Services

**Texas Department of State
Health Services**

Texas Department of State Health Services • Immunization Unit • MC-1946 • P. O. Box 149347 • Austin, TX 78714-9347 • (800) 252-9152

2018 - 2019 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Child-Care and Pre-K Facilities

This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in the Texas Administrative Code (TAC), Title 25 Health Services, §§97.61-97.72. This chart is not intended as a substitute for consulting the TAC, which has other provisions and details. The Department of State Health Services (DSHS) is granted authority to set immunization requirements by the Human Resources Code, Chapter 42.

A child shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a child-care facility or public or private elementary or secondary school in Texas.

Age at which child must have vaccines to be in compliance:	Minimum Number of Doses Required of Each Vaccine							
	DTaP	Polio	HepB	Hib	PCV	MMR	Varicella	HepA
0 through 2 months								
By 3 months	1 Dose	1 Dose	1 Dose	1 Dose	1 Dose			
By 5 months	2 Doses	2 Doses	2 Doses	2 Doses	2 Doses			
By 7 months	3 Doses	2 Doses	2 Doses	2 Doses ¹	3 Doses ²			
By 16 months	3 Doses	2 Doses	2 Doses	3 Doses ¹	4 Doses ²	1 Dose ³	1 Dose ³	
By 19 months	4 Doses	3 Doses	3 Doses	3 Doses ¹	4 Doses ²	1 Dose ³	1 Dose ³	
By 25 months	4 Doses	3 Doses	3 Doses	3 Doses ¹	4 Doses ²	1 Dose ³	1 Dose ³	1 Dose ³
By 43 months, but before Kindergarten entry	4 Doses	3 Doses	3 Doses	3 Doses ¹	4 Doses ²	1 Dose ³	1 Dose ³	2 Doses ³

¹ A complete Hib series is two doses plus a booster dose on or after 12 months of age (three doses total). If a child receives the first dose of Hib vaccine at 12 - 14 months of age, only one additional dose is required (two doses total). Any child who has received a single dose of Hib vaccine on or after 15 - 59 months of age is in compliance with these specified vaccine requirements. Children 60 months of age and older are not required to receive Hib vaccine.

² If the PCV series is started when a child is seven months of age or older or the child is delinquent in the series, then all four doses may not be required.

Please reference the information below to assist with compliance:

- For children seven through 11 months of age, two doses are required.
- For children 12 - 23 months of age: if three doses have been received prior to 12 months of age, then an additional dose is required (total of four doses) on or after 12 months of age. If one or two doses were received prior to 12 months of age, then a total of three doses are required with at least one dose on or after 12 months of age. If zero doses have been received, then two doses are required with both doses on or after 12 months of age.
- Children 24 months through 59 months meet the requirement if they have at least three doses with one dose on or after 12 months of age, or two doses with both doses on or after 12 months of age, or one dose on or after 24 months of age. Otherwise, one additional dose is required. Children 60 months of age and older are not required to receive PCV vaccine.

³ For MMR, Varicella, and Hepatitis A vaccines, the first dose must be given on or after the first birthday. Vaccine doses administered within 4 days before the first birthday will satisfy the requirement.

Information on exclusions from immunization requirements, provisional enrollment, and acceptable documentation of immunizations may be found in §97.62, §97.66, and §97.68 of the Texas Administrative Code, respectively.

Vaccines:

DTaP: Diphtheria, tetanus, and acellular pertussis (whooping cough); record may show DT or DTP

Polio: IPV - inactivated polio vaccine; OPV – oral polio vaccine

HepB: Hepatitis B vaccine

Hib: Haemophilus influenzae type b vaccine

PCV or PCV13: Pneumococcal conjugate vaccine

MMR: Measles, mumps, and rubella vaccines combined

Varicella: Chickenpox vaccine. May be written VAR on record.

HepA: Hepatitis A vaccine



TEXAS
Health and Human
Services

**Texas Department of State
Health Services**

Texas Department of State Health Services • Immunization Unit • MC-1946 • P. O. Box 149347 • Austin, TX 78714-9347 • (800) 252-9152